

Resultaten fille Bratelle studie

AANLEIDING

BORSTOEDEEM EN/OF FIBROSE NA BEHANDELING TEGEN BORSTKANKER IS EEN COMPLICATIE DIE KAN OPTREDEN IN DE ACUTE FASE, DIRECT NA DE BEHANDELING (BORSTSPAREND, RADIOTHERAPIE) OF ZICH IN EEN LATER STADIUM ONTWIKKELT EN CHRONISCH WORDT.

PATIËNTEN MET DEZE COMPLICATIE HEBBEN REGELMATIG LAST VAN PIJN DIE WORDT VERONDERSTELD SAMEN TE HANGEN MET BORSTOEDEEM EN/OF FIBROSE. ER ZIJN BEPERKTE BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN EN DE UITKOMSTEN VARIËREN EN ZIJN NOG NIET UITGEBREID ONDERZOCHT.



30
DEELNEMERS

deelnemers

- BORSTKANKER
- CHRONISCH OEDEEM
- OEDEEMTHERAPEUT
- TIJD SINDE OPERATIE > 1 JAAR




GEMIDDELDE LEEFTIJD
DEELNEMERS

58,9
JAAR



6,5 jaar (2-9 jaar)
SINDE DE OPERATIE



pijn



lichaamsbeeld



borstklachten



**kwaliteit van
leven**

bij de start	38,2	70,1	52,3	76,1
na 1 maand	30,9	77,3	27,7	77,2
na 3 maanden	22,9	81,3	16,6	83,9
	0 is goed	100 is goed	0 is goed	100 is goed

conclusie

SIGNIFICANTE VERBETERINGEN

VOOR 80% VAN DE VROUWEN

data-analyse

MISSENDE INFORMATIE
GEEN VERGELIJKINGSGROEP